

# แนวทางปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์คลอดปกติครบกำหนด เครื่องช่วยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
กระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้จ่ายสมเหตุผล  
เครือข่าย RDU จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๙



หญิงตั้งครรภ์คลอดปกติครบกำหนด อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 37 สัปดาห์

กรณีต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ

1. Woman with meconium stained amniotic fluid
2. Woman with episiotomy

ประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ

1. Preterm with true labour pain
2. Third or fourth degree perineum tear
3. Manual removal of placenta
4. ภาวะ chorioamnionitis, sepsis
5. Fecal contamination



พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ

Third or fourth degree tear

- Amoxicillin (500 mg) 1 tab oral + Metronidazole (400 mg) 1 tab oral stat หรือ Augmentin (1 g) 1 tab bid
- กรณี NPO ให้ IV form

Fecal contaminate ระหว่างคลอด

- Amoxicillin (500 mg) 1 tab oral tid (7 วัน)

Group B Streptococcus (GBS) prophylaxis:

- Ampicillin 2 gm IV q 6 hr จนกระทั่งคลอด ให้หยุด antibiotic
- Term with PROM > 18 ชม.
  - Preterm with in labour

Chorioamnionitis

- Ampicillin 2 gm IV q 6 hr + Gentamicin 240 mg IV OD ก่อนคลอด จนกระทั่งใช้ลง 24 ชม. ต่อด้วย Amoxicillin (500 mg) 1 tab tid + Metronidazole (400 mg) 1 tab tid จนครบ 7 วัน

GBS prophylaxis หากแพ้ penicillin:

- ถ้าอาการไม่รุนแรง/ไม่มี Anaphylaxis: Cefazolin 2 gm IV 6 hr + สังเกตอาการ
- ถ้าอาการรุนแรง/มี Anaphylaxis: Clindamycin 900 mg IV q 8 hr