

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคท้องร่วงเฉียบพลัน เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
กระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
เครือข่าย RDU จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุง มกราคม ๒๕๖๙

Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกติอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 สัปดาห์

กรณีที่ไม่ให้ยาปฏิชีวนะ

- ไม่มีไข้
- อาหารเป็นพิษ มีอาการอาเจียนเป็นอาการเด่น


การให้สารน้ำ เช่น ORS, IV fluid

ยาเหลืองปิดสมุทร (500 mg/capsule)

- ผู้ใหญ่: 2 แคปซูล ทุก 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ครั้ง
- อายุ 6-15 ปี: 1 แคปซูล ทุก 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ครั้ง
- เด็กอายุ < 6 ปี: ไม่แนะนำ

ให้ยาตามอาการ
เช่น ยาลดไข้ ยาลดการหดเกร็งของลำไส้

กรณีที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ



ชื่อยา	ความแรงยาที่มีใน รพ.สุราษฎร์ธานี	ขนาดยา	
		เด็ก	ผู้ใหญ่
Ciprofloxacin	500 mg/tab, 50 mg/ml suspension (ยาเตรียม)	15 mg/kg วันละ 2 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 mg/day	500 mg วันละ 2 ครั้ง
Ceftriaxone	2 gm/vial	50-100 mg/kg IV OD ไม่เกิน 1,500 mg/day	1-2 gm IV OD
Norfloxacin	400 mg/tab, 10 mg/ml suspension (ยาเตรียม)	5-10 mg/kg วันละ 2 ครั้ง ขณะท้องว่าง (ผู้ที่เป็น/สงสัย shigellosis 7.5-10 mg/kg วันละ 2 ครั้ง)	400 mg วันละ 2 ครั้ง ขณะท้องว่าง
Doxycycline	100 mg/cap	- เด็กโต (8 ปีขึ้นไป): 100 mg วันละ 2 ครั้ง	100 mg วันละ 2 ครั้ง
Erythromycin	250 mg/cap, 125 mg/5 ml dry syrup	10 mg/kg วันละ 4 ครั้ง นาน 7 วัน	500 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน
Azithromycin	250 mg/cap, 200 mg/5ml	10 mg/kg วันละ 1 ครั้ง นาน 3 วัน	500 mg วันละ 1 ครั้ง นาน 3 วัน
Metronidazole	400 mg/tab	35-50 mg/kg/day แบ่งให้ วันละ 3 ครั้ง นาน 5-10 วัน	500-750 mg วันละ 3 ครั้ง นาน 5-10 วัน

* ห้ามใช้ยาบรรเทาอาการอุจจาระร่วงที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ furazolidone, nifuroxazide, phthalylsulfathiazole, neomycin, colistin

นัดติดตามอาการ 1 วัน
ให้คำแนะนำ หากอาการแย่ลง หลังการรักษา 1-2 วัน หรือยังไม่ดีขึ้นใน 3-4 วัน ควรกลับมาพบผู้ทำการรักษา